

**DIFFERENZIALDIAGNOSEN BEI SCHMERZEN IM OBERSCHENKEL**

Erster Eindruck:

- Alter:
  - Junger Patient:
    - Epiphysiolysis capitis femoris
    - häusliche Gewalt (Verdacht bei Schmerzen auf der Rückseite des Oberschenkel)
  - Älterer Patient:
    - Oberschenkelhalsfraktur,
    - Spontanfrakturen möglich
  
- Erstmals aufgetretene oder bereits Monate anhaltende Schmerzen?

**Möglich durchführbare Untersuchungen:**

- Beine im Seitenvergleich ansehen
- Schmerzen im zeitlichen Verlauf sehen
- Beinumfang messen
- Gangbild
- Wärme
- Knöchel-Arm-Index
- Ultraschall
- Doppler
- Röntgen
- D-Dimere
- Reiseanamnese

**Abwendbar gefährliche Abläufe:**

- Entzündung:
  - Thrombophlebitis
  - Haarbalgabszess
  - Würmer
  - Leishmaniose
  - Zoster
  - Borreliose
  - Diszitis

- Tumor:
  - Abszess am Iliopsoas
  - Spinalkanalverengung
  - Hirntumor (Endstrecke der Schmerzweiterleitung)
  - Rektum-/Prostatakarzinom
  - Metastasen (ossär)
  
- Trauma: (Sport etc.)
  - Arthrose
  - TEP-Luxation
  - Muskulär (Faserriss, Muskelabriss)
  - Verbrühung, Sonnenbrand
  - Embolie, akuter Verschluss
  - Bandscheibenvorfall
  - Hodentorsion
  - Schiefer
  - Spritzenabszess
  - Kompartmentsyndrom (eher Unterschenkel)
  - Meralgia parästhetica (durch Enge Jeans bei dünnen Patientinnen, -> B12 Gabe)
  
- Stoffwechsel
  - Statine (Muskelschmerzen bis Rhabdomyolyse)
  - Thrombose
  - Vit D (Mangel?)
  
- Gefäße
  - Lymphstau
  - Varikosis
  
- Psyche
  - Es wären typischerweise beide Oberschenkel betroffen/ diffusere Symptome
  - Schizophrenie