

Der rote Unterschenkel

Kriterien für die Praxis:

- Akut oder Chronisch
- Mit oder ohne Schmerzen
- Mit oder ohne B Symptomatik (Krankheitsgefühl, Fieber)

- Hellrot: Erysipel
- Dunkelrot: Venöse Insuffizienz, Thrombophlebitis
- Blaurot: Verschlusskrankheit (pAVK)

Überlegungen zum Abwendbar gefährlichen Verlauf:

Trauma: Fremdkörper, Knochenbruch mit Weichteilverletzung, Sonnenbrand, Verbrennung

Infektion: Erysipel,

Gefäß: pAVK, venöse Insuffizienz

Stoffwechsel: Diabetisches Ulcus, UV + Medikament (Amiodaron, Doxycyclin)

Tumor: Spinocelluläres Carcinom, Plattenepithelcarcinom

Psyche: keine

Diagnostische Verfahren:

Gute Anamnese (Metallunverträglichkeit)

Dopplersonographie

Labor: (Entzündungswerte, Leukocyten)

Abstrich: Bei offenen Stellen

Therapie bei Phlegmone:

Mitte der Wahl: Penicillin, alternativ Amoxicillin + Clavulansäure.

Wenn therapieresistent: stationäre Einweisung